



LA BASTIDE
CABINET DENTAIRE

Conseils post-opératoires

Vous venez de bénéficier d'une intervention chirurgicale (exactions dentaires, pose d'un ou plusieurs implants, exérèse de kystes...).

OEDEME	Pour diminuer le gonflement post opératoire appliquer une poche de glace 15min/heure les 2 premiers jours.
HEMOSTASE	Pour éviter les saignements, la plaie ne doit pas être touchée. Un saignement discret est normal le premier jour. Eviter de cracher et de vous rincer la bouche pendant 48h.
HYGIENE	Le nettoyage des dents se fait avec une brosse à dent souple, en ménageant la zone de la plaie. Démarrer le bain de bouche 48h après l'intervention sans gargâner fortement.
DOULEUR	Prendre les médicaments prescrits contre la douleur avant son apparition et dès l'heure suivant l'intervention. L'aspirine est contre-indiquée.
HEMATOME	Un hématome de la joue peut survenir dans les jours suivant l'intervention. Il est sans gravité et disparaît en une semaine.
REPOS	Eviter toute activité physique pendant 2 à 4 jours.
ALCOOL/TABAC	Ils sont formellement contre-indiqués pendant 1 semaine car ils perturbent la coagulation et la cicatrisation.
ALIMENTATION	Le temps de l'anesthésie ne pas manger chaud pour éviter une morsure ou une brûlure.
MEDICATION	Suivez les prescriptions. Le bain de bouche ne doit pas être utilisé les 2 premiers jours après l'intervention.

En cas d'urgence (saignement incessant, fièvre + de 38°, forte douleur), n'hésitez pas à revenir vers nous au 03.88.64.02.79



LA BASTIDE
CABINET DENTAIRE

Conseils post-opératoires

Vous venez de bénéficier d'une intervention chirurgicale (exactions dentaires, pose d'un ou plusieurs implants, exérèse de kystes...).

OEDEME	Pour diminuer le gonflement post opératoire appliquer une poche de glace 15min/heure les 2 premiers jours.
HEMOSTASE	Pour éviter les saignements, la plaie ne doit pas être touchée. Un saignement discret est normal le premier jour. Eviter de cracher et de vous rincer la bouche pendant 48h.
HYGIENE	Le nettoyage des dents se fait avec une brosse à dent souple, en ménageant la zone de la plaie. Démarrer le bain de bouche 48h après l'intervention sans gargiller fortement.
DOULEUR	Prendre les médicaments prescrits contre la douleur avant son apparition et dès l'heure suivant l'intervention. L'aspirine est contre-indiquée.
HEMATOME	Un hématome de la joue peut survenir dans les jours suivant l'intervention. Il est sans gravité et disparaît en une semaine.
REPOS	Eviter toute activité physique pendant 2 à 4 jours.
ALCOOL/TABAC	Ils sont formellement contre-indiqués pendant 1 semaine car ils perturbent la coagulation et la cicatrisation.
ALIMENTATION	Le temps de l'anesthésie ne pas manger chaud pour éviter une morsure ou une brûlure.
MEDICATION	Suivez les prescriptions. Le bain de bouche ne doit pas être utilisé les 2 premiers jours après l'intervention.

En cas d'urgence (saignement incessant, fièvre + de 38°, forte douleur), n'hésitez pas à revenir vers nous au 03.88.64.02.79